

Razones para Derivar

Derive a un especialista en lactancia a las **madres** que tienen o que están experimentando lo siguiente:

- Está preocupada por la forma de sus pezones (pezones planos o invertidos)
- Antecedentes de cirugía de mamas o de pecho
- Reflejo de eyección de leche tardío
- Problemas continuos con la posición o el acoplamiento boca - pezón
- Está preocupada de que su bebé no reciba suficiente cantidad de leche (y usted también lo está)
- La hinchazón no desaparece pasadas las 24 horas
- Dolor en los pezones que no cesa después de haber corregido la posición y el acoplamiento boca - pezón
- Pezones agrietados, que sangran y/o con hematomas
- Pezones que pican y de color rojizo (pueden ser aftas)
- Dolor en los pechos que no desaparece en 24 horas (puede ser un conducto obstruido)
- Dolor en los pechos y/o bultos rojizos y calientes, sin fiebre (puede ser mastitis)
- El bebé se ahoga o regurgita mientras toma el pecho; la madre está preocupada (puede ser un reflejo de eyección de leche hiperactivo)
- Las heces del bebé son verdosas y espumosas, o los pechos se sienten llenos después de haber amamantado (puede ser una sobreproducción de leche)
- Baja producción de leche o el bebé toma fórmula y otros suplementos
- El proveedor del cuidado de la salud le dijo a la madre que destetara a su bebé y ella no quiere hacerlo
- Uso de pezoneras (o tetinas de biberón sobre el pecho)
- Enfermedades severas u hospitalización
- Tiene una enfermedad crónica, como por ejemplo diabetes
- Dejó de amamantar y quiere empezar de nuevo
- Está preocupada por los medicamentos que debe tomar mientras da el pecho
- Uso de remedios a base de hierbas

Derive a un proveedor del cuidado de la salud a las **madres** que tienen o que están experimentando lo siguiente:

- Pezones que pican y de color rojizo (pueden ser aftas)
- Dolor en los pechos que no cesa en 72 horas (puede ser que un conducto que aún esté obstruido)
- Dolor en los pechos y/o bultos rojizos y calientes, sin fiebre (puede ser mastitis)
- Antecedentes de cirugía de mamas o de pecho
- Uso de medicamentos
- Enfermedad severa
- Enfermedad crónica como la diabetes

Derive a un especialista en lactancia a las madres de **bebés** que tienen o que están experimentando lo siguiente:

- Problemas para prenderse al pezón
- La madre no escucha al bebé tragar pasadas las 48 horas de vida
- Tomas que duran más de una hora después de establecida la producción de leche
- Parece tener hambre después de la mayoría de las tomas
- No se relaja durante la toma o mantiene el puño apretado junto a la cara
- Tiene la boca seca después de la mayoría de las tomas
- Regurgita después de la mayoría de las tomas
- Menos de 3 pañales con caca en un período de 24 horas después de los 3 días de vida
- Menos de 6 pañales mojados en un período de 24 horas después de los 3 días de vida
- El proveedor del cuidado de la salud le dijo a la madre que su bebé no está aumentando lo suficiente de peso
- El proveedor del cuidado de la salud le dijo a la madre que su bebé tiene retraso del desarrollo
- El proveedor del cuidado de la salud le dijo a la madre que le diera fórmula a su bebé
- El bebé está durmiendo mucho y come en muchas tomas cortas
- El bebé tiene demasiado sueño como para tomar el pecho
- Rechazo de la lactancia por más de 24 horas
- Bebé prematuro (bebés que nacieron más de 1 mes antes de la fecha de parto)
- Bebés múltiples (mellizos, gemelos, trillizos, etc.)
- La madre dice que el bebé tiene labio leporino o paladar hendido
- La madre dice que el bebé tiene problemas cardíacos
- La madre dice que el bebé tiene síndrome de Down
- Piel y ojos de color amarillento (podría ser ictericia)

Derive a un proveedor del cuidado de la salud a las madres de bebés que tienen o que están experimentando lo siguiente:

- Piel y ojos de color amarillento (podría ser ictericia)
- Pérdida de peso pasada la primera semana
- Aumento lento de peso
- La madre dice que el bebé tiene fiebre
- La madre dice que el bebé está enfermo